

## ニトログリセリン 投与量計算早見表

条件：1A (5mg/10mL) を生食 or 5%ブドウ糖 90 mL に溶解して、計 100 mL で使用

		手術時の低血圧維持						
		手術時の異常高血圧の救急処置						
初めは0.05 $\gamma$ で良いかと思われませう！		不安定狭心症						
		急性心不全（慢性心不全の急性増悪を含む）						
		投与量 ( $\gamma$ : $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ )						
		0.05	0.1	0.5	1	2	3	5
体重(kg)	20	1.2	2.4	12	24	48	72	120
	25	1.5	3	15	30	60	90	150
	30	1.8	3.6	18	36	72	108	180
	35	2.1	4.2	21	42	84	126	210
	40	2.4	4.8	24	48	96	144	240
	45	2.7	5.4	27	54	108	162	270
	50	3	6	30	60	120	180	300
	55	3.3	6.6	33	66	132	198	330
	60	3.6	7.2	36	72	144	216	360
	65	3.9	7.8	39	78	156	234	390
	70	4.2	8.4	42	84	168	252	420
	75	4.5	9	45	90	180	270	450
80	4.8	9.6	48	96	192	288	480	

単位：mL/h

薬剤科 2020.7作成